


Personnes vivant avec le VIH en Guadeloupe

Répartition annuelle des patients suivis en milieu hospitalier en Guadeloupe en fonction du sexe de 1996 à 2006



En 2006

- ✘ Une file active qui augmente en raison
 - de nouvelles contaminations
 - d'une durée de vie plus longue des malades grâce aux traitements antirétroviraux
- ✘ 1 400 patients vivant avec le VIH/sida (PVVIH) bénéficient d'un suivi médico-psycho-social au Centre d'information sur l'immuno-déficience humaine (CISIH)
- ✘ 154 nouveaux patients suivis
- ✘ 39 femmes enceintes suivies
- ✘ 10 % patients âgés de moins de 30 ans
- ✘ 1/3 des patients âgés de plus de 50 ans
- ✘ 1/3 des patients au stade de maladie sida

Source : CISIH

Découvertes de séropositivité VIH en Guadeloupe

Depuis le début de la mise en place de la notification obligatoire des découvertes de séropositivité VIH (2003)

- ✘ 403 découvertes de séropositivité notifiées au 31/12/2006
- ✘ 70 % de contamination hétérosexuelle
- ✘ 53 % de femmes
- ✘ 56 % des découvertes chez des personnes âgées de 30 à 49 ans
- ✘ 44 % des hommes diagnostiqués de nationalité française
- ✘ 50 % des femmes diagnostiquées de nationalité étrangère
- ✘ Formes cliniques au moment du diagnostic
 - o 2 % de primo-infection
 - o 48 % au stade asymptomatique
 - o 21 % au stade de maladie sida
- ✘ Test d'infection récente réalisé chez 55 % des diagnostics d'infection à VIH
 - o Infection récente inférieure à 6 mois chez 18% de personnes ayant eu le test

Source : Institut de veille sanitaire Surveillance du VIH

Données cumulées de 2003 au 31/12/2006 non-corrigées pour la sous-déclaration


Nouveauté : Afin d'améliorer l'exhaustivité et la qualité des données recueillies, la notification obligatoire anonymisée de l'infection par le VIH et du sida a été modifiée en juillet 2007 d'une part chez l'adulte/adolescent et d'autre part chez l'enfant de moins de 15 ans (13 ans auparavant)
 Pour en savoir plus :
 URL : <http://www.invs.sante.fr/surveillance/vih-sida/PDF/modif_fiches_vih_sida.pdf>

Cas de sida en Guadeloupe

Au 31/12/2004

- ✘ 2^{ème} région française la plus touchée
- ✘ En 2004, 37 cas de sida diagnostiqués soit un taux de cas de sida diagnostiqués de 82 par million d'habitants (taux national de 22 par million d'habitants)

Répartition des cas de sida par sexe et par année de diagnostic de 1996 à 2004



Les données provisoires non redressées pour les délais de déclaration des années 2005 et 2006 n'ont pas été présentées dans cette figure.

Depuis le début de l'épidémie

- ✘ Nombre de cas de sida cumulés au 31/12/2006 en Guadeloupe : 1253 (estimation)
- ✘ Une majorité d'hommes (65 %)
- ✘ Prédominance de la contamination hétérosexuelle
- ✘ 51 % des cas décédés
- ✘ Découverte de la séropositivité à l'entrée dans le sida pour 50 % des cas

Source : Institut de veille sanitaire Surveillance du sida

Quelques travaux sur l'infection par le VIH et le sida en Guadeloupe et dans les départements français d'Amérique

Etude sur les personnes vivant avec le VIH (DFA)

Bouillon K., Lert F., Schmaus A., Spire B., Dray-Spira R. Les patients vivant avec le VIH-sida dans les départements français d'Amérique : résultats de l'enquête ANRS-VESPA, 2003. Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 2005, 45-46 : 240-242.

Etude en population générale (DFA)

Halfen S., Fénies K., Ung B., Grémy I., Les connaissances, attitudes, croyances et comportements face au VIH/sida aux Antilles et en Guyane en 2004, rapport ORS Ile-de-France, avril 2006 (rapport 290 pages et synthèse 4 pages, téléchargement sur www.ors-idf@ors-idf.org)

Etude en milieu scolaire (Guadeloupe)

Cornely V. et al., Infection par le VIH ; Connaissance de l'infection à VIH-sida enquête chez les jeunes scolarisés en Guadeloupe. 2001. 22 pages.

Dossier thématique

ORSaG, Epidémiologie de l'infection à VIH/sida en Guadeloupe. 2006. 16 pages.



Quelques points de repères

Situation au niveau national en 2006

- ✘ Une diminution globale du nombre de séropositivités (6 300 en 2006 et 6 700 en 2005)
- ✘ Une diminution du nombre de diagnostics de sida (estimation 1022 en 2006 et 1298 en 2005)
- ✘ Un arrêt de l'augmentation du nombre de découvertes de séropositivité chez les homosexuels
- ✘ Une diminution, parmi les découvertes de séropositivité, de la proportion des dépistages tardifs, au stade sida
- ✘ Chez les homosexuels masculins, risque demeurant toujours élevé en raison du multipartenariat et de la baisse de vigilance
- ✘ Nécessité de renforcer les actions de prévention dans les DFA où les taux de séropositivité et de cas de sida sont supérieurs dans l'ensemble à la moyenne nationale
- ✘ Amélioration de la question de la séropositivité des personnes de nationalité étrangère

Pour en savoir plus : BEH thématique n°46-47 (27 novembre 2007)

URL : <http://www.invs.sante.fr/beh/2007/46_47/beh_46_47.pdf>

Situation au niveau mondial en 2006

- ✘ 33 millions de personnes vivant avec le VIH (PVVIH)
- ✘ 3 millions de personnes nouvellement infectées
- ✘ 2 millions de décès dus au sida
- ✘ Diminution des nouvelles infections en Afrique depuis 2001, continent le plus touché par l'épidémie (22 millions de PVVIH)
- ✘ Augmentation de 150 % du nombre de PVVIH en Europe orientale et en Asie centrale depuis 2001 (630 000 en 2001 à 2 millions en 2007)

URL : <<http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/pr61/fr/index.html>>

REDACTION : VANESSA CORNELY

© OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE DE GUADELOUPE (ORSaG)
1301 cité Grain d'Or, Avenue Sidambarom - 97100 BASSE TERRE (Guadeloupe)
Tel : 0590 387 448 – Fax : 0590 387 984 – Courriel : orsag@wanadoo.fr